



BAH Zwischenfrucht Summer Mix

Mischung zur Stickstoffbindung und Futtererzeugung

- sehr gute Futterwerte durch Kombination mit Leguminosen
- Erfüllung von Ökoregelung 2: Anbau vielfältiger Kulturen möglich
- Einjähriges Weidelgras:
 - schneller Aufwuchs (unter günstigen Bedingungen in 6-8 Wochen schnittreif), um Futterlücken auszugleichen
 - braucht keine Vernalisation für den Übergang in die generative Phase
 - nicht winterhart
 - bildet blattreiche Horste mit hohen Trockenmasseerträgen
- Sommerwicken:
 - Stickstoffsammler
 - schnellwüchsig
 - bildet viele Feinwurzeln bin in tiefere Bodenschichten
 - frostempfindlich
- Inkarnatklée:
 - N-Sammler
 - überwinternd
 - sehr gut in Futtermischungen mit Gräsern (schmackhaft und proteinreich)

Produktdetails	
Leguminosenanteil	28 %
Samen*	x
Gülleausbringung	x
Saatstärke	50 kg/ha
Körner/m ²	700
Saatzeit	Mitte Juni – Ende August
Düngung ¹	mineralisch, organisch, keine
Wasserbedarf	niedrig bis mittel
Überwinterung	teilweise

Zusammensetzung	Masse %	Samen %*
Sommerwicken	40	4
Inkarnatklée	15	24
einj. Weidelgras	45	72

Fruchtfolgeeignung	
Raps	x
Kartoffeln	x
Getreide	x
Mais	x
Leguminosen	-
Zuckerrüben	x

*Aus technischen Gründen kann der exakte Anteil wegen der unterschiedlichen Korngewichte (TKG) schwanken

¹ vorbehaltlich länderspezifischer Regelungen

Bei Fragen wenden Sie sich gerne an Ihren zuständigen Vertriebsmitarbeiter.